

## C02 レーザー治療同意書

C02（炭酸ガス）レーザーとは、水分量を多く含むホクロやいぼ（脂漏性角化症）へ直接照射することで、熱エネルギーで蒸散させ、ホクロの色味やいぼの盛り上がりを取り除く治療です。

### ◆治療内容◆

- ・この治療は皮膚表面に C02レーザーを照射し、いぼ、ほくろ、シミ等の病変を除去することを目的とした治療です。
- ・ほとんどの治療は1回で終了しますが、症例によっては複数回の治療が必要な場合もあります。
- ・治療箇所を冷やした後、局所麻酔を行います。
- ・出血はほとんどありません。
- ・治療部位は閉鎖療法を行い、やがてかさぶたになります。
- ・かさぶたは 1~2 週間程度で自然に剥がれます。浸出液が出ている間は処方薬と保護用のテープを貼ってください。治療箇所によって治療後の手当の仕方をご説明いたします。

### ◆注意事項◆

- ・他院を含め、1 か月以内に美容治療を受けた方はお申し出ください。
- ・治療当日はシャワー浴、翌日から入浴が可能です。患部は濡らさないように注意してください。
- ・治療箇所の肌は、乾燥しやすい状態ですので十分に保湿をしてください。
- ・治療部位の化粧は上皮化完了後から可能です。
- ・治療部位は日焼け止めなどを使用し、日焼け予防対策をしてください。
- ・治療部位の炎症が完全に治まるまで、その部位の追加治療はできません。
- ・治療後の反応には個人差があります。上記内容以外の症状が生じた場合は、担当医師またはスタッフにお知らせください。また、ご不明な点は必ず治療前にお申し出ください。

※治療効果をご期待に添えない場合や副作用が発症した場合でもご返金は出来かねます。

追加治療や薬の処方等の際は患者様ご負担になりますことを了承ください。

### ◆禁忌事項◆

- ・治療箇所に悪性腫瘍のある方
- ・ケロイド体質の方
- ・妊娠中の方

※ その他、医師が不相当と認めた場合は治療を受けることが出来ません

◆副作用◆

- ・施術後に、再発・ケロイド瘢痕・陥没・脱毛・白斑・色素沈着が生じる可能性があります
- ・稀に治療部位には、腫れや水疱が生じる場合があります。必要な治療を行いますので、当院の指示に従ってください。
- ・かさぶたを無理に剥がすと、傷療やシミの原因となる場合があります。
- ・一時的に炎症後色素沈着が生じる事がありますが、通常数ヶ月で改善します。  
症状によっては、お薬を処方する場合があります。
- ・症例により、かさぶたが剥がれた後3～6ヶ月程度、傷の凹みや赤み、色素沈着が残る場合があります。

私はCO2 レーザー治療の説明を受け、内容を十分理解・納得いたしましたので、施術を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

氏名 \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

保護者：氏名 \_\_\_\_\_（続柄： \_\_\_\_\_）

シュシュレディースクリニック戸田公園