

A 型ボツリヌス毒素注射同意書

A 型ボツリヌス毒素は筋肉と神経の接合部に作用し、局所的に筋肉の動きを抑制します。この作用を応用することで、しわを作る筋肉の過剰な収縮を弱めて、しわを目立たなくします。また筋肉の肥大が原因で張り出した部位に対しても、A 型ボツリヌス毒素注射は有効です。

◆施術確認事項◆

- ・ 持続期間・経過は個人差があり、数か月～半年程度となります。医師の説明することはおおよその予測とご承知ください。
- ・ 効果の発現に数日～1 ヶ月程かかり、部位により異なります。
- ・ 女性は2か月、男性は3 ヶ月避妊してください。
- ・ 治療後は、注入部に発赤・腫れ、箇所によっては重く感じる場合があります。また、内出血や鈍痛などが現れる場合がありますが、時間の経過良好と共に軽快します。
- ・ 当日の洗顔は可能ですが、強く擦ったり触ったりせず、飲酒、長風呂、激しい運動は避けてください。
- ・ 元の骨格等により、多少の左右差がでることがあります。
- ・ 術後は、理由の如何に問わず施術料金のご返金には応じかねますのでご了承ください。
- ・ 次回の注射は3か月以上経ってからとなります。

◆禁忌事項◆

- ・ A 型ボツリヌス毒素にアレルギーのある方
- ・ 妊娠中、授乳中の方
- ・ 全身性の神経筋縫合部の障害を持つ方

◆副作用◆

- 額・眉間の場合 ①頭痛、頭重感 ②上方凝視困難感 ③軽度の眼瞼下垂 ④外側眉毛挙上
- 表情じわ・目尻 ①微笑みが不自然に感じる
- えら ①咀嚼の困難感
- 脇・鼻下（汗抑制）①完全に汗を抑えることは不可能
②鼻下の場合は、鼻下の弛緩、延長感、口すぼめ困難
- 肩 ①脱力感

私はA型ボツリヌス毒素注射の説明を受け、内容を十分理解・納得いたしましたので、施術を受けることに同意いたします。

年 月 日

氏名： _____

住所 _____